

تمارين 01

نعتبر الدالة f المعرفة على $] -\infty; -1[\cup] -1; 1[\cup] 1; +\infty[$ بـ $D_f =] -\infty; -1[\cup] -1; 1[\cup] 1; +\infty[$ $f(x) = x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$.

1. أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. استنتج المستقيمات المقاربة الموازية لمحور الترتيب.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها. أكتب معادلة للمماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
3. من ملاحظة جدول التغيرات خمن وجود مركز تناظر للمنحني (C_f) ثم أثبت صحة أو عدم صحة تخمينك.
4. بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب مائلا للمنحني (C_f) عند $-\infty$ و عند $+\infty$.
5. أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ) .
6. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $] -1; 1[$ يطلب إيجاد، باستعمال حاسبة بيانية، حصر له سعتة 0,1.
7. أرسم المستقيمات المقاربة و المنحني (C_f) .
8. ناقش بيانيا إشارة و عدد حلول المعادلة : $(m - 1 - x)(x^2 - 1) - x = 0$

تمارين 02

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$

1. أدرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$.
2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصورا بين 0,5 و 0,9.
3. حدد، حسب قيم x ، إشارة $g(x)$

الجزء الثاني: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 1}{3x}$

و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث وحدة الأطوال هي 3cm.

1. أدرس نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$ ، إشارة $f'(x)$ هي من نفس إشارة $g(x)$.
3. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.
4. بين أن $f(\alpha) = \frac{\alpha}{6} + \frac{1}{2\alpha}$ ثم استنتج، باستعمال حصر العدد α ، حصر للعدد $f(\alpha)$.
5. أرسم المنحني (C_f)
6. ناقش بيانيا إشارة و عدد حلول المعادلة : $f(x) = m + 1$

تمارين 03

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{-x^2 + 5x - 15}{2x - 4}$

C هو التمثيل البياني لها في معلم متعامد ومتجانس $(O; I, J)$

1. بين أن $f'(x) = \frac{-x^2 + 4x + 5}{(2x - 4)^2}$ حيث f' هي مشتقة f ثم ادرس إشارة f'

ب- ادرس نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف، استنتج أن المنحني C يقبل مستقيما مقاربا عموديا D .

ج- شكل جدول تغيرات f .

2. - عين الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 4}$

ب- بين أن المستقيم الذي معادلته $y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}$ مقارب للمنحني C .

3. أ- عين إحداثيات نقط التقاطع A و B للمنحني C مع حامل محور الفواصل.

ب- عين معادلة لكل من المماسين T_A و T_B للمنحني C عند النقطتين A و B على الترتيب.

4. أرسم المنحني (C_f)

تمارين 04

نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{6}{x} - \frac{9}{2x^2} + \frac{1}{x^3}$

C هو التمثيل البياني لها في معلم متعامد و متجانس $(O; I, J)$ الوحدة $3cm$.

1. درس تغيرات f ، شكل جدول التغيرات.

2. أ- حل المعادلة $f(x) = 0$ ، استنتج أن للمنحني C لا يقطع محور الفواصل.

ب- حسب جدول التغيرات ناقش حسب قيم اعداد الحقيقي m عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

ج- عين معادلة لكل من المماسين T_1 و T_2 للمنحني C عند النقطتين اللتين فاصلتهما $\frac{1}{2}$ و 1 .

4. أنشئ المماسين T_1 ، T_2 و المنحني C .

تمارين 05

نعتبر دالة كثير الحدود p المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $p(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 5$

(1) أ) ادرس تغيرات p .

ب) بين أن المعادلة $p(x) = 0$ تقبل حلا واحدا في α المجال في المجال $[0;1]$.

• أعط حصرا لـ α سعته 10^{-1} .

ج) عين إشارة $p(x)$ حسب قيم x .

(2) نعتبر الدالة f المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 1}{(x+1)^2}$

(C) المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الوحدة $2cm$

أ) عين نهاية الدالة f عند -1 . فسر بيانها النتيجة.

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) أ) احسب $f'(x)$. بين انه من أجل كل x من $]-1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{P(x)}{(x+1)^3}$

ب) شكل جدول تغيرات f

(3) أ) بين أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x - 2$ مقارب للمنحني (C) عند $+\infty$.

ب) ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى Δ .

(4) عين معادلة للمماس T للمنحني (C) الممثل للدالة f عند النقطة التي فاصلتها 0.

(5) أنشئ (C)، T والمستقيمات المقاربة.

تمارين 06

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{-x^3 - 2x^2 - x - 4}{(x+1)^2}$

(1) عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 : $f(x) = ax + \frac{b}{(x+1)^2}$

2. أ- احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف

ب- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f'(x) = \frac{-(x-1)(x^2+4x+7)}{(x+1)^3}$

ج- ادرس إشارة $f'(x)$ و شكل جدول تغيرات f

3. بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا واحدا α حيث $-2,5 < \alpha < -2$

4. بين أن المستقيم D الذي معادلته $y = -x$ مقارب للمنحني (C) عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

5. أرسم D و المنحني (C) الممثل للدالة f في معلم متعامد $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، الوحدة: $2cm$ على محور الفواصل و $1cm$ على محور الترتيب.

تمارين 07

f و g دالتان معرفتان على $[1; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = x + \frac{x+1}{x^3}$ و $g(x) = x - \frac{2x-1}{x^4}$

(C_f) و (C_g) هما التمثيلان البيانيان للدالتين f و g في معلم متعامد و متجانس الوحدة على المحورين $1cm$

1. أ- تحقق من أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = x$ مستقيم مقارب لـ (C_f) و (C_g) عند $+\infty$.

ب- عين وضعية (C_f) بالنسبة إلى Δ ثم وضعية (C_g) بالنسبة إلى Δ .

ج- ادرس تغيرات كل من f و g على $[1; +\infty[$.

د- شكل جدولي تغيرات كل من f و g .

هـ - أنشئ Δ ، (C_f) و (C_g) .

تمارين 08

نعتبر الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = ax + \frac{b}{4x+2}$ مع a و b عددا حقيقيان.

1. أ - عين D_f مجموعة تعريف الدالة f .

ب - بين أن الدالة f تقبل الاشتقاق على كل مجال من المجموعة D_f .

ج - عين العددين a و b بحيث من أجل كل $x \in D_f$ ، $f'(0) = \frac{7}{2}$ و $f(0) = -\frac{3}{2}$.

2. أ — أحسب النهايات عند حدود المجموعة D_f .
 ب — برّر أنه من أجل كل $x \in D_f$ ، $f'(x) > 0$.
 ج — أنجز جدول تغيرات الدالة f .
3. نسمي $\mathcal{C}_f$ المنحني الممثل للدالة f في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
 أ — برهن أن المستقيم ذي المعادلة $y = \frac{1}{2}x$ هو مستقيم مقارب للمنحني $\mathcal{C}_f$.
 ب — أكتب معادلة لمماس المنحني $\mathcal{C}_f$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .
 ج — برهن أن النقطة ω ذات الإحداثيتين $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$ هي مركز تناظر للمنحني $\mathcal{C}_f$. أرسم المنحني $\mathcal{C}_f$.

تمارين 09

- لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x+1)^2}$.
 نسمي $\mathcal{C}_f$ المنحني الممثل لها في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- أدرس تغيرات الدالة f . استنتج أن المنحني $\mathcal{C}_f$ يقبل مستقيما مقاربا عموديا .
 - بين أن المستقيم ذي المعادلة $y = x$ هو مقارب مائل للمنحني $\mathcal{C}_f$.
 - أدرس وضعية المنحني $\mathcal{C}_f$ بالنسبة إلى المستقيم المقارب له المائل .
 - أحسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحني $\mathcal{C}_f$ مع حامل محور الفواصل .
 - أكتب معادلة للمماس Δ عند النقطة ذات الفاصلة 1 .
 - أنشئ Δ ثم المنحني $\mathcal{C}_f$.
 - لتكن الدالة g المعرفة بـ : $f(x) = x^2 \cdot \frac{|x|+2}{(|x|+1)^2}$.
 - برهن أن g زوجية ، و أن $g = f$ على مجال يطلب تعيينه .
 - ادرس استمرارية g عند الصفر ثم اشتقاقية g عند الصفر
 - أنشئ C_g

تمارين 10

لتكن الدالة المعرفة على R^* بـ : $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 4}{x^2}$

1. عين الثوابت الحقيقية a, b بحيث : $f(x) = x + a + \frac{b}{x^2}$

2. ادرس تغيرات الدالة f و عين المستقيمات المقاربة.

3. أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (Δ) ميله 2 يطلب معادلته.

4. أنشئ المماس (Δ) ثم المنحنى (C_f) .

5. أوجد النقاط من المنحنى (C_f) التي إحداثياتها صحيحة.

6. m وسيط حقيقي ، ناقش حسب قيم m إشارة و عدد حلول المعادلة : $f(x) = 2x + m$.

7. لتكن الدالة g المعرفة على R^* $g(x) = |x| + \frac{x^2 + 4}{x^2}$.

• تحقق أن الدالة g زوجية. ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنى C_g

• بين أن $g = f$ على مجال يطلب تعيينه. ثم أنشئ C_g

8. ناقش بيانيا إشارة و عدد حلول المعادلة : $g(x) = m$