

سلسلة تطبيقات نموذجية

(ملخص الدرس + تمارين تطبيقية + فروض وامتحانات تدريبية)

krimbench@yahoo.fr

المستوى: 3 علوم تجريبية إعداد الأستاذ: بن الشيخ عبد الكريم (تقرء - ورقة)

الدرس 1: النهايات والاستمرار

ملخص درس النهايات

حالات عدم التعيين	العمليات على النهايات	
$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0 \times \infty$ $\infty - \infty$	$\frac{a}{\infty} = 0$ $\frac{\infty}{a} = \infty$ $\frac{a}{0} = \infty$ ($a \neq 0$)	$(a \neq 0)$ $a \times \infty = \infty$ $\infty \times \infty = \infty$
		$+\infty + a = +\infty$ $-\infty + a = -\infty$ $+\infty + \infty = +\infty$ $-\infty - \infty = -\infty$
التفسير الهندسي للنهاية		
• $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ معناه المستقيم $y = l$ مستقيم مقارب لـ (C_f) عند ∞		
• $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ معناه المستقيم ذا المعادلة $x = a$ مستقيم مقارب لـ (C_f)		
• $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ معناه احتمال وجود مستقيم مقارب للمنحنى (C_f) عند ∞		
المستقيم المقارب المائل		
• $y = ax + b$ (Δ) مستقيم مقارب لـ (C_f) عند ∞ يعني $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$		
• إذا $f(x) = ax + b + \phi(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} \phi(x) = 0$ يعني $y = ax + b$ مقارب مائل لـ (C_f) عند ∞		
• لدراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى $y = ax + b$ ندرس إشارة الفرق $[f(x) - (ax + b)]$		
نهاية دالة مركبة $f = v \circ u$ إذا $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} v(x) = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$		
النهايات و الترتيب		
إذا $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = l$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = l$ فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$		
إذا $f(x) \geq g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = +\infty$		
إذا $f(x) \leq g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$		





التمرين 01 (تذكير والتدريب على حساب النهايات)

① ادرس نهاية الدالة f ، إذا كانت غير معرفة عند a ادرس النهاية على يمين وعلى يسار a

1	$f(x) = 2x^3 - x + 1$ عند $+\infty$ ، $-\infty$	4	$f(x) = \frac{x+1}{(x-2)^2}$ عند $+\infty$ ، $-\infty$ ، عند 2
2	$f(x) = -3x^4 + 2x + 4$ عند $+\infty$ ، $-\infty$	5	$f(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x}$ عند $+\infty$ ، $-\infty$ ، عند 0
3	$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ عند $+\infty$ ، $-\infty$ ، عند -1	6	$f(x) = x^2 + x - \frac{1}{x-3}$ عند $+\infty$ ، $-\infty$ ، عند 3

التمرين 02 (تخمين النهايات)

في كل حالة من الحالات الثلاث خمن النهايات في أطراف مجموعة التعريف D وأعط معادلة لكل مستقيم مقارب لمنحنى C_f الدالة f .



2- لتكن الدالة f المعطاة بجدول تغيراتها التالي :

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-	-
$f(x)$	$1 \rightarrow +\infty$	$-\infty \rightarrow -\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4} \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow 1$	1

(1) عين مجموعة تعريف الدالة f والنهائيات عند حدود مجموعة التعريف.

(3) أعط معادلة لكل مستقيم مقارب لمنحنى الدالة f .

(4) في معلم منعاد ومنجانس ، ارسم تمثيل بياني C_f للدالة f وايضا المستقيمات المقاربة لـ C_f

التمرين 03 (حساب نهائية)

احسب النهايات التالية

حساب نهائية باستعمال العددي المشتق	حساب نهائية لدوال جذرية	حساب نهائية دالة مركبة
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x}$ •	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+1}-x$ • $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2+x}+x+2$ • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2+4}-2x+1$ • $+\infty$ عند $f(x) = \sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2x}$ •	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x-1}{2x-4}}$ • $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{9x^2-x+3}$ • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x+4}{x^2-3}\right)$ •

التمرين 04 (حساب نهائية باستعمال المقارنة و العصر)

① نعتبر الدالة f المعرفة على R^* ب $f(x) = 1 + \frac{\cos x}{x^2}$

1. بين أنه من أجل كل x من R^* ، $1 - \frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x^2}$. استنتج نهايتي الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

② نعتبر الدالة f المعرفة على R ب $f(x) = \frac{x}{2+\sin x}$

1. بين أنه من أجل كل x من R ، $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2+\sin x} \leq 1$ ، استنتج نهايتي الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

التمرين 05 (حساب نهائية باستعمال طرق أخرى)

بين باستعمال طريقة مناسبة أن :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{x+1}-1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\cos x}} = 2\sqrt{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x^2-3x+2} = -3$$

التمرين 06 (التفسير الهندسي للنهايات)

فسر هندسيا النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +3} f(x) = -\infty$$


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-1)] = 0$$

التمرين 07 المستقيمات المقاربة - الوضعية



- f دالة معرفة على $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{x + 1}$ و (C_f) منحنىها في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$
- 1. عين بيانيا ثم حسابيا نهايات الدالة f على أطراف D_f
- 2. حدد الأعداد الحقيقية a, b, c بحيث $f(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$
- 3. استنتج معادلات المستقيمتان المقاربة للمنحنى (C_f)
- 4. من البيان ثم بالحساب حدد الوضع النسبي لـ (C_f) واطارباته

التمرين 08 حساب النهايات - التفسير الهندسي

- لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2; 1\}$ بـ: $f(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + x - 2}$
- 1. حدد حسب قيم x إشارة $x^2 + x - 2$.
- 2. أدرس النهايات من اليمين ومن اليسار عند كل من -2 و 1 .
- 3. أدرس نهايتي الدالة f عند $+\infty$ وعند $-\infty$. فسر هندسياً.

التمرين 09 المستقيمات المقاربة - الوضعية النسبية

- نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$
- 1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. استنتج المستقيمتان المقاربة لمحور التناوب.
- 2. بين أنه من أجل كل x من D_f ، $f(x) = x + 1 + \frac{x}{x^2 - 1}$
- 3. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيماً مقارباً مائلاً للمنحنى (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
- 4. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيمات المقاربات (Δ) .

التمرين 10 المستقيمات المقاربة - الوضعية النسبية

- f هي الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 + \sqrt{x^2 + 4x}$
- و (C) منحنىها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم.
- ① بين أن المستقيم Δ الذي معادلته $y = 2x + 3$ مقارب للمنحنى (C) عند $+\infty$ ادرس الوضعية النسبية لـ (C) و Δ .

التمرين 11 المستقيمات المقاربة - الوضعية النسبية

- نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x + 1)^2}$
- 1. عين a, b, c, d بحيث من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x + 1)^2}$
- 2. استنتج أن المنحنى (C) الممثل للدالة f يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $-\infty$ و $+\infty$ يطلب تعيين معادلته له.
- 3. حدد وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى (Δ) .

التمرين 12 حساب النهايات - المستقيمات المقاربة - الوضعية النسبية

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$$

• نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$:

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ ثم } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$$

(2) استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C) الممثل للدالة f عند $+\infty$.

$$(3) \text{ اـ احسب } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$\text{ب- بين انه يوجد عدان حقيقيان } \alpha \text{ و } \beta \text{ بحيث : } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \alpha , \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \alpha x] = \beta$$

ج- استنتج ان المنحنى (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ') عند $-\infty$ - يطلب تعيين معادله له .

التمرين 13 اختيار من متعدد


عين الإجابة الصحيحة دون تبرير

في الشكل الموهالي لدينا الرسم البياني C_f لدالة f معرفة على

$$D = [0; 1[\cup]1; +\infty[$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 3x - 2}{2(x^2 - 1)}$$

$$\text{والمستقيم } \Delta \text{ الذي معادلته } y = \frac{1}{2}x - 2$$



1. المستقيم الذي معادلته

C_f لا يقبل مستقيما مقاربا أفقيا ولا عموديا	C_f مقارب لـ $x=1$	C_f مقارب لـ $y=1$
---	----------------------	----------------------

$$2. \text{ من أجل كل من }]1; +\infty[: f(x) = \frac{1}{2}x + a + \frac{bx+c}{2(x^2-1)}$$

$c=3, b=2, a=1$	$c=-3, b=-2, a=2$	$c=-3, b=2, a=-2$
-----------------	-------------------	-------------------

3. C_f يقبل مستقيما مقاربا عند $+\infty$ معادلته:

$y = \frac{1}{2}x - 2$	$y = \frac{1}{2}x + 2$	$y = \frac{1}{2}x + 1$
------------------------	------------------------	------------------------

4. C_f يقطع المستقيم المقارب في

C_f لا يقطع المستقيم المقارب في أية نقطة.	النقطة $B\left(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4}\right)$	النقطة $A\left(\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$
---	--	--

التمرين 14 (من مسائل البكالوريا)

لكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{+1\}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x-1)^2}$ C_f تمثيلها في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد (O, I, J) .

1. عين نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف.

$$2. \text{ عين الأعداد الحقيقية } a, b, c \text{ حيث يكون من أجل كل عدد حقيقي } x \neq 1 : f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x-1)^2}$$

3. ماذا نستنتج بالنسبة للمنحنى C_f والمستقيم (d) الذي معادلته $y = x - 2$ ؟ برر.

4. حدّد وضعية C_f بالنسبة لـ (d) ، لكنك A نقطة تقاطع C_f و (d) .

ملخص درس الإستمرارية

$$f \text{ مستمرة عند } a \text{ يعني } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

- القول أن الدالة f مستمرة على مجال I يعني أن f مستمرة عند كل عدد حقيقي من I .
- التفسير البياني:** تكون الدالة f مستمرة على مجال I عندما يمكن رسم منحنيها البياني على هذا المجال دون رفع القلم [اليد].
- تقبل بأن كل الدوال المقررة في هذا المسنوى والمحصلة عليها بالعمليات على دوال مألوفة أو بتركيبها مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها

نتائج

- الدوال المرجعية مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها.
- الدوال كثيرات الحدود، $\sin$ و $\cos$ مستمرة على R .
- الدوال الناطقة [حاصل قسمة كثيري حدود] مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها.

مبرهنة القيم المتوسطة

f دالة معرفة ومستمرة على مجال $[a; b]$.

من أجل كل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ ، يوجد على الأقل عدد حقيقي c محصور بين a و b بحيث $f(c) = k$.

المعادلة $f(x) = k$

إذا كانت f دالة معرفة ومستمرة على $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ ،

المعادلة $f(x) = k$ تقبل على الأقل حلاً c محصوراً بين a و b .

إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة تماماً على مجال $[a; b]$ فإنه من أجل كل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ ،

المعادلة $f(x) = k$ تقبل حلاً وحيداً في المجال $[a; b]$

حالة خاصة: إذا كانت f دالة مستمرة ورتيبة على $[a; b]$ وكان $f(a) \times f(b) < 0$ فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً في $[a; b]$

التمرين 01 الإستمرارية

$$1. \text{ لتكن الدالة } f \text{ المعرفة على } R \text{ كما يلي: } \begin{cases} f(x) = x^2 - 2x + 1 & ; x \leq 2 \\ f(x) = x^2 + x - 5 & ; x > 2 \end{cases}$$

ادرس استمرارية الدالة f عند 2 ، هل الدالة f مستمرة على R ؟ ماذا ؟

$$2. \text{ ادرس استمرارية الدالة } f \text{ المعرفة على } R \text{ ب: } \begin{cases} f(x) = -x^2 + x + 2 & ; x \leq 1 \\ f(x) = \frac{1}{2}x + 1 & ; x > 1 \end{cases}$$

$$3. f \text{ دالة عددية معرفة كما يلي: } f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} \text{ إذا كان } x \neq 1 \text{ و } f(1) = 3 \text{ ادرس استمرارية } f \text{ عند } 1. \text{ هل الدالة } f \text{ مستمرة على } R \text{ ؟}$$

$$4. f \text{ دالة معرفة على } [-1; +\infty[\text{ ب: } f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{x+1}}{x} & ; x > 0 \\ \frac{1 - x^2}{x - 2} & ; x \leq 0 \end{cases} \text{ ادرس استمرارية } f \text{ عند } 0. \text{ ثم استنتج أن } f \text{ مستمرة على } [-1; +\infty[$$

$$5. \text{ حدد العدد الحقيقي } \alpha \text{ حتى تكون الدالة } f \text{ المعرفة بـ } f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{x} & ; x \neq 0 \\ \alpha & ; x = 0 \end{cases} \text{ مستمرة على } R$$

التمرين 02 رمز القيمة المطلقة

• نعتبر الدالة f المعرفة على $R - \{2, 4\}$ ب:

$$f(x) = \frac{|x-3|+1}{(x-2)(x-4)}$$

1. أكتب عبارة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

2. ادرس استمرارية الدالة f عند القيمة 3

التمرين 03 دالة الجزء الصحيح

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-1; 2[$ ب:

$$f(x) = xE(x) + 1$$

حيث الدالة $x \mapsto E(x)$ هي الدالة الجزء الصحيح

1. عين عبارة $f(x)$ على كل من المجالات التالية: $[-1; 0[$ ، $[0; 1[$ و $[1; 2[$.

2. أرسم في معلم $(O; I, J)$ المنحني الممثل للدالة f .

3. هل الدالة f مستمرة على المجال $[-1; 1[$ ؟ على المجال $[-1; 2[$ ؟

التمرين 04 مبرهنة القيم المتوسطة

1. برهن باستخدام مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $x^3 - 4x = -2$ تقبل على الأقل حلا في المجال $[-3; -2]$

2. نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; 2]$ كما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = 2x + 1 & ; 0 < x \leq 1 \\ f(x) = -2x + 3 & ; 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

• هل يمكن تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة لإثبات أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا في المجال $[0; 2]$ ؟

• تحقق أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا واحدا في $[0; 2]$.

3. لتكن f دالة مستمرة على المجال $]-3; +\infty[$ و جدول تغيراتها هو الآتي:

x	-3	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-2	4	2

بين أن المنحني (C_f) الممثل للدالة f يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين مختلفتين يطلب إعطاء حصرا لفاصلتيهما. ثم عين إشارة $f(x)$

4. نعتبر الدالة f المعرفة بـ: $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في R

5. نعتبر الدالة f المعرفة على R بـ: $f(x) = -2x^3 + 3x^2 - x + 5$

ادرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها ثم بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في R . ثم عين إشارة $f(x)$

6. نعتبر الدالة f المعرفة على $[1; 2]$ ب: $f(x) = x^4 - x^2 + 1$

• ادرس تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

• بين أن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلا وحيدا α في $[1; 2]$. ما التفسير البياني

• باستخدام حاسبة بيانية أوجد حصرا سعته 0.25 للعدد α

نموذج 1 الفرض الاول في مادة الرياضيات

النمرين الاول :

- لتكن الدالة f المعرفة على $R - \{-2\}$ بحيث :

$$f(x) = \frac{(x+1)^3}{x^2 + 4x + 4}$$

وليكن (C_f) المنحنى البياني للدالة في معلم متعامد ومتجانس $(0; \vec{i}; \vec{j})$

1. أحسب النهايات على اطراف مجموعة التعريف

2. عين الاعداد $d; c; b; a$ بحيث : $f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x+2)^2}$

3. استنتج معادلة المستقيم المقارب المائل (Δ) لـ (C_f)

4. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى (Δ)

النمرين الثاني :

- اليك جدول تغيرات f دالة عددية معرفة على $R - \{1\}$:

x	$-\infty$	α	1	2	5	$+\infty$
$f'(x)$		+		-	0	+
$f(x)$	-2010	$\nearrow +\infty$		$\searrow +\infty$	$\nearrow -5$	


من خلال قراءتك لجدول التغيرات اجب عن ما يلي :

- 1- حدد اتجاه تغير الدالة f .
- 2- عين حلول المعادلة $f(x) = 0$.
- 3- حدد إشارة $f(x)$.
- 4- عين معادلات المستقيمات المقاربة.
- 5- نضع :

$$g(x) = \sqrt{f(x)}$$

- حدد D_g مجموعة تعريف g
- حدد اتجاه تغير الدالة g

نموذج 2 الفرض الاول في مادة الرياضيات



التمثيل البياني C_f المقابل هو للدالة f في معلم متعامد ($1\text{cm} = 1u$ على محور الفواصل و $1\text{cm} = 5u$ على محور الترتيب) المستقيم D يشترك مع C_f في النقطة $(0, -1)$ و هو خط مقارب مائل بالنسبة لـ C_f

نعلم أيضا أن C_f يقبل مماسين موازيين لمحور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين $\sqrt{3}$ و $-\sqrt{3}$

(1) انطلاقا من المعطيات و الشكل أ) عين مجموعة تعريف الدالة f

(ب) حدد نهايات f عند حدود مجموعة تعريفها

(ج) أكتب معادلة D و المستقيمت المقاربة للمنحنى C_f

(2) أنشئ جدول تغيرات f .

(3) في الحقيقة نعلم أن عبارة الدالة f هي من الشكل $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{2x}{ax^2 + bx + c}$ باستعمال النتائج السابقة عين الأعداد α, β و a, b, c (علل بدقة)



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.